



DIHIDROLIP 10mg COMPRIDOS RECUBIERTOS Clorhidrato de Lercanidipina

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de Lercanidipina 10mg, Lactosa 45mg y Excipientes c.s.p.

Indicación: Tratamiento de la hipertensión arterial esencial leve a moderada.

Vía de administración: Oral.

Posología: Dosis inicial en adultos: 10mg una vez al día. En pacientes cuya respuesta al tratamiento después de 4 semanas resulte insuficiente, incrementar a 20mg una vez al día. Administrar de preferencia en la noche.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Se desaconseja el consumo de alcohol durante el tratamiento debido al riesgo de hipotensión severa. El uso de este producto se ha asociado a la posibilidad de sufrir de mareos, somnolencia y fatiga, lo cual compromete la capacidad de conducir vehículos u operar maquinaria. La eficacia y seguridad de este producto no se ha establecido en pacientes menores a 18 años.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con angina de pecho inestable, infarto agudo al miocardio recientemente (Menor a 30 días), insuficiencia cardíaca congestiva no tratada, insuficiencia renal y/o hepática severa, obstrucción ventricular.