



GLIPTIN-M 50mg-500mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS **Fosfato monohidratado de Sitagliptina – Clorhidrato de Metformina**

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Sitagliptina (Como Fosfato monohidratado de Sitagliptina) 50mg, Metformina (Como Clorhidrato de Metformina) 500mg y Excipientes c.s.p.

Indicación: Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2, en aquellos pacientes en los cuales la monoterapia no es efectiva.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Adultos: Dos (02) comprimidos recubiertos al día.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que por criterio médico el balance beneficio/riesgo sea favorable. De ser imprescindible su uso, por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase definitivamente la lactancia materna. Este medicamento no debe usarse en pacientes con diabetes tipo 1 y no debe utilizarse para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. No es sustituto de la insulina ni puede ser empleado en todas las formas de diabetes. La administración de este producto debe estar asociada a la implementación de otras medidas no farmacológicas que deben ser prescritas por el médico y el personal de la salud. Deben determinarse periódicamente las concentraciones de creatinina sérica. horas antes de una cirugía electiva con anestesia general, espinal o epidural o antes de la realización de un estudio radiológico con utilización de contraste yodado y, no debe reanudarse el tratamiento antes de que hayan pasado 48 horas desde estos procedimientos y sólo después de reevaluar la función renal y comprobar que es normal. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Pacientes ancianos. Pacientes con alteración de la función renal o hepática, por presentar mayor riesgo a desarrollar hipoglicemia o insuficiencia cardíaca.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con: Acidosis de cualquier etiología, administración intravascular de agentes de contraste yodados, alcoholismo, cetoacidosis diabética, coma diabético; deshidratación, embarazo y lactancia, infarto de miocardio reciente, infección grave, insuficiencia cardíaca o respiratoria, insuficiencia hepática, insuficiencia renal moderada y grave, intoxicación aguda por alcohol, pacientes menores de 18 años.