



REFLUXYL 0,400g-0,375g/15mL SUSPENSIÓN ORAL **Bicarbonato de sodio-Alginato de sodio**

Composición: Cada 15mL contienen: Bicarbonato de sodio 0,400g, Alginato de sodio 0,375g, Acesulfame K 3,000mg, Sucralosa 1,875mg, Solución de sorbitol al 70% 11,1113g y Excipientes c.s.p.

Indicaciones: Antiácido. Tratamiento sintomático del malestar digestivo, ocasionado por hiperacidez gástrica y coadyuvante en el tratamiento del reflujo gastroesofágico.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Adultos: 10 a 20mL después de cada comida y antes de acostarse.

Advertencias: Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este producto. Si los síntomas persisten por más de tres días con el uso de este medicamento, suspéndase el uso y consulte al médico. Consulte al médico antes de administrar este producto si está en tratamiento con otro medicamento. Utilizar este medicamento bajo supervisión médica en aquellos casos en que se requiera una dieta baja en sal No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: En pacientes con insuficiencia renal, cardíaca o hipertensión arterial.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. No se administre en niños menores de 12 años.