



DEXAMETASONA 2x5 2mL SOLUCIÓN INYECTABLE

Composición: Cada ampolla (2mL) contiene: Dexametasona (Como Fosfato sódico de Dexametasona), Metabisulfito de sodio 2mg y Excipientes c.s.p.

Indicación: Insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, afecciones inflamatorias inmunológicas o alérgicas susceptibles de tratamiento con corticosteroides.

Vía de administración: Parenteral (Intravenoso, intramuscular, intraarticular).

Posología (Dosis recomendada): Niños menores de 6 años: Consulte al médico. Niños de 6 años a 12 años: 0,08mg a 0,3mg/Kg/día dividida en dosis cada 6 a 12 horas. Niños mayores de 12 años y Adultos: 0,75mg a 9mg/día dividida en dosis cada 6 a 12 horas.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que por criterio médico el balance beneficio/riesgo sea favorable. De ser imprescindible su uso, por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase definitivamente la lactancia materna. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Pacientes con: Cirrosis, hipertensión arterial, hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con: Anastomosis intestinal reciente, diabetes mellitus, diverticulitis, herpes ocular simple, infecciones agudas o crónicas, miastenia grave, osteoporosis, psicosis, tromboembolismo, tuberculosis activa o curada, úlcera péptica activa o latente.