



DUVADILAN 10mg/2mL SOLUCIÓN INYECTABLE **Clorhidrato de Isoxsuprina**

Composición: Cada 2mL (Ampolla) contienen: Isoxsuprina (Como Clorhidrato de Isoxsuprina) 10,00mg y Excipientes c.s.p.

Indicación: Amenaza de parto prematuro.

Vía de administración: Intramuscular (I.M.) o Intravenosa (I.V.).

Posología (Dosis recomendada): Fase aguda: Preparar una solución que contenga 200mcg/mL y administrar de 200mcg a 300mcg por minuto por vía intravenosa según la respuesta de la paciente. Luego, una (01) ampolla por vía intramuscular cada cuatro (04) o seis (06) horas por cuarenta y ocho (48) horas. Seguidamente iniciar tratamiento por vía oral.

Modo de uso: Para preparar 50mL de solución, se requiere una ampolla.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. Durante la administración de este producto, debe realizarse un control estricto del estado de hidratación de la paciente, así como sus signos vitales y los del feto. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: En caso de Enfermedad Broncopulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Arritmias.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula, hemorragia arterial reciente, isquemia cardíaca o arritmia inestable.