



SISTEMA MÚSCULO ESQUELETICO
ETOROCZIA 60mg TABLETAS RECUBIERTAS
Etoricoxib

Composición: Cada 100g contienen: Clotrimazol 1,000g, Neomicina (Como Sulfato de Neomicina) 0,500g, Beclometasona (Como Dipropionato de Beclometasona) 0,025g, Agua purificada, Alcohol cetosteárico, Butilhidroxitolueno, Fosfato monosódico dihidratado, Glicerina, Metilparabeno, Parafina, Polietilenglicol hexadecil éter, Propilenglicol, Propilparabeno.

Indicación: Tratamiento de las dermatosis inflamatorias que responden a corticosteroides, complicadas con infecciones secundarias por hongos y/o bacterias.

Vía de administración: Tópico.

Posología (Dosis recomendada): Niños mayores de 12 años y Adultos: Aplicar dos (02) veces al día en la zona afectada hasta completa remisión de los síntomas. El uso de dosis mayores no genera beneficios terapéuticos adicionales y, por el contrario, podría ocasionar la aparición de efectos adversos.

Dosificación en pacientes especiales:

Ancianos: No se requieren ajustes de dosificación.

Insuficiencia hepática: No se requieren ajustes de dosificación.

Insuficiencia renal: No se requieren ajustes de dosificación.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que por criterio médico el balance



beneficio/riesgo sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. El uso prolongado de la Beclometasona tópica, puede producir cambios atróficos irreversibles en la piel. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Durante el uso de este medicamento evite la exposición indiscriminada a la luz solar. En caso de presentarse enrojecimiento de la piel o agravarse las lesiones preexistentes, suspéndase el uso y consulte al médico. En pacientes ancianos y niños ya que, pueden absorber sistémicamente mayor cantidad de corticosteroides tópicos. En pacientes con heridas abiertas, debido a la posibilidad de mayor absorción sistémica del producto, insuficiencia renal.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con acné, infecciones cutáneas de origen viral.