



CARDIPIRINA 80mg CÁPSULAS CON MICROGRÁNULOS CON CUBIERTA ENTÉRICA
Ácido acetilsalicílico

Composición: Cada cápsula con microgránulos con cubierta entérica contiene: Ácido acetilsalicílico 80,00mg y Excipientes c.s.p.

Indicación: Coadyuvante como antiagregante plaquetario en la prevención primaria y secundaria de enfermedades cardiovasculares de origen trombótico.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Adultos: Una (01) cápsula al día.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que por criterio médico el balance beneficio/riesgo sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. El uso prolongado de la Beclometasona tópica, puede producir cambios atróficos irreversibles en la piel. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Precauciones: Durante el uso de este medicamento evite la exposición indiscriminada a la luz solar. En caso de presentarse enrojecimiento de la piel o agravarse las lesiones preexistentes, suspéndase el uso y consulte al médico. En pacientes ancianos y niños ya que, pueden absorber sistémicamente mayor cantidad de corticosteroides tópicos. En pacientes con heridas abiertas, debido a la posibilidad de mayor absorción sistémica del producto, insuficiencia renal.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con acné, infecciones cutáneas de origen viral.