



GLIPTIN-M 50mg-500mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Fosfato de Sitagliptina – Clorhidrato de Metformina

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Sitagliptina (Como Fosfato de Sitagliptina) 50mg, Metformina (Como Clorhidrato de Metformina) 500mg y Excipientes c.s.p.

Indicación y Posología: A juicio del facultativo.

Vía de administración: Oral.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. Este medicamento no debe usarse en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y no debe utilizarse para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. No es sustituto de la insulina ni puede ser empleado en todas las formas de diabetes. La administración de este producto debe estar asociada a la implementación de otras medidas no farmacológicas que deben ser prescritas por el médico y el personal de la salud. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes embarazadas y en período de lactancia. Pacientes con administración intravascular de agentes de contraste yodados, cetoacidosis diabética, coma diabético, deshidratación, historial de infarto al miocardio, infección grave, insuficiencia cardíaca o respiratoria,



insuficiencia hepática y/o renal grave, intoxicación aguda por alcohol, shock. La eficacia y seguridad de este producto no se ha establecido en pacientes menores a 18 años.