



NIZOX 500mg TABLETAS RECUBIERTAS
Nitazoxanida

Composición: Cada tableta recubierta contiene: Nitazoxanida 500,00mg, Almidón de maíz 213,91mg, Propilparabeno 0,31mg, Metilparabeno 0,49mg y Excipientes c.s.p.

Indicaciones: Tratamiento de las infestaciones agudas y crónicas causadas por: *Áscaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, *Fasciola hepatica*, *Giardia lamblia*, *Hymenolepididae*, *Strongyloides stercoralis*, *Trichuris trichiuria*. Tratamiento de la diarrea causada por *Cryptosporidium parvum* en pacientes no inmunocomprometidos.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Niños mayores de 12 años y Adultos: Una (01) tableta recubierta cada doce (12) horas por tres (03) días continuos, recomendándose repetir el esquema de tratamiento después de dos (02) semanas.

Indicaciones: Tratamiento de las infestaciones agudas y crónicas causadas por: *Áscaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, *Fasciola hepatica*, *Giardia lamblia*, *Hymenolepididae*, *Strongyloides stercoralis*, *Trichuris trichiuria*.

Vía de administración: Oral.

Advertencias: La nitazoxanida no trata deshidratación causada por diarreas excesivas, por lo que se debe asegurar que el individuo esté recuperando líquido.

Precauciones: La nitazoxanida no trata deshidratación causada por diarreas excesivas, por lo que se debe asegurar que el individuo esté recuperando líquido.



Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Uso en niños menores de 1 año de edad. Evaluar el riesgo-beneficio en pacientes con enfermedad biliar, hepática o renal. En caso de pacientes diabéticos supervisar los niveles de glucosa dado que NIZOX polvo para reconstituir en suspensión oral contiene en su formulación sacarosa por lo que se debe modificar la terapia hipoglicemia apropiadamente. De igual manera evaluar riesgo beneficio en pacientes inmunocomprometidos.